



手卫生

医院感染管理科 牙晶晶 2025年7月



- 一、手卫生的定义和内容
- 二、手卫生的重要性
- 三、手卫生设施
- 四、洗手/卫生消毒
- 五、外科手消毒
- 六、我院手卫生管理要求

一、手卫生的定义和内容

定义: 医务人员洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。

手卫生

洗手



医务人员用流动水和 洗手液(肥皂)揉搓 冲洗双手,去除手部 皮肤污垢、碎屑和部 分微生物的过程。

卫生手消毒



医务人员用手消毒剂揉 搓双手,以减少手部暂 居菌的过程。

外科手消毒



外科手术前医务人员用流动水和洗手液揉搓冲洗双手、前臂至上臂下1/3,再用手消毒剂清除或者杀灭手部、前臂至上臂下1/3暂居菌和减少常居菌的过程。

二、手卫生的重要性-防止交叉感染

工作人员的手是医疗机构病原体传播的重要媒介。

如果不执行手卫生,会发生什么?

工作人员手部 病原体传播给 患者,导致患 者感染/定植, 发生医院感染。



工作人员感染/定植自身手部的病原体,进而将病原体传播给家人、朋友。



手卫生可以切断病原体传播途径;

是预防医院感染最简单,最有效,最经济的方法!



二、手卫生的重要性-政策文件支持



4 手卫生管理与基 本要求 4.1 医疗机构 纳入医疗质量考核, 提高医务人员手卫 生的依从性。



三、手卫生设施

用于洗手与手消毒的设施 设备,包括洗手池、水龙 头、流动水、洗手液(肥 皂)、干手用品、手消毒 剂等。





四、洗手/卫生手消毒—指征

五个指征"2前3后":

- ▶接触患者前
- ▶清洁/无菌操作前
- >接触血液体液后
- >接触患者后
- >接触患者周围环境后



"2前"防止病原体传播给患者, "3后"防止病原体传播给医务人员和环境。

四、洗手/卫生手消毒一方式选择

A

B

下列情况宜卫生手消毒:

✓ 手部没有肉眼可见污染时。

下列情况应洗手:

- ✓ 当手部有血液或其他体液 等肉眼可见的污染时;
- ✓ 可能接触艰难梭菌、肠道 病毒等对速干手消毒剂不 敏感的病原微生物时。

四、洗手/卫生手消毒一洗手方法













1. 湿手

2. 取液 取洗手液,均 匀涂抹手掌、 手背、手指和 指缝。

3. 揉搓 共6个步骤,总 时长至少15秒。

4. 冲洗 5. 干手 6. 护肤

洗手(1-6步)时长约40-60秒。

揉搓步骤一"内外夹弓大立腕"



图A. 1 掌心相对, 手指并拢相互揉搓

图A. 2 手心对手背沿指缝相互揉搓

图A. 3 掌心相对, 手指交叉指缝相互揉搓



图A. 4 弯曲手指关节在掌心旋转揉搓

图A.5 大拇指在掌心旋转揉搓

图A. 6 五指并拢, 指尖在掌心旋转揉搓

腕部污染时,进行第7步

1-6步为必做步骤, 第7步为必要时。每个步骤至少揉搓5次, 1-6步揉搓总时长至少15秒。



手卫生操作视频: 洗手视频

四、洗手/卫生手消毒—卫生手消毒方法



1. 取液

取手消毒液,均匀涂抹手掌、手背、手指和指缝。



2. 揉搓

共6个步骤(内外夹攻大 立腕),总时长至少15秒。

取液和揉搓时长约20-30秒。

四、洗手/卫生消毒一注意事项

1. 干手方法: 一次性毛巾或擦手纸、烘手机。避免二次污染。







2. 戴手套不能代替手卫生,摘手套后应进行手卫生。

五、外科手消毒-原则



- ✓ 1. 先洗手, 后消毒
- ✓ 2. 不同患者手术之间、 手套破损或手被污染时, 应重新进行外科手消毒

五、外科手消毒-准备工作



- ✓ 1. 穿洗手衣裤,卷袖至上 臂上1/3以上。
- ✓ 2. 戴医用外科口罩、帽子。
- ✓ 3. 摘除手部饰物,修剪指甲,指甲长度不超过指尖。

五、外科手消毒-方法

(一) 外科洗手

- 1. 揉搓清洗。取适量洗手液揉 搓双手、前臂和上臂下1/3。
- 2. 冲洗。流动水冲洗双手、前 臂和上臂下1/3。
- 3. 干手。使用干手用品擦干双手、前臂和上臂下1/3。

(二) 外科手消毒

- 1. 外科冲洗手消毒。
- 2. 外科免冲洗手消毒。
 - (1) 消毒右手指尖、前臂和上臂下1/3。
 - (2)消毒左手指尖、前臂和上 臂下1/3。
 - (3) 消毒手部。



外科手消毒流程

一、洗手



准备: 洗手之前应先摘除手部饰物, 修剪指甲,长度应不超过指尖,并使 用指甲清洁器清洁指甲下污垢, 卷袖 至上臂上1/3以上



湿手:流动水湿润双手、前臂及上臂下1/3





掌心对手背沿指缝相互揉搓, 交换进行

掌心相对,双手交叉指缝相互揉搓



掌心相对, 手指并拢, 相互揉搓

弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉



右手握左手大拇指旋转揉搓, 交换进行



将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋 转揉搓, 交换进行





冲洗:指尖朝上用流动水冲净双 手、前臂及上臂下1/3, 使水由手部流向肘部



干手: 用无菌擦手纸或无菌巾分别 擦干双手、前臂及上臂下1/3

步骤一



五个手指尖浸于消毒液中5秒





左手用剩余消毒液涂抹并旋转揉搓右手腕、前臂及上臂下1/3、保证手消毒液均匀覆盖所有的皮肤、需时约15秒、相同步骤 消毒另一只手及手臂。揉搓上臂时不可超越清洁线。

步骤二

取消毒液2ml于手掌心, 按图①一⑥的步骤揉搓 双手, 时间约20-30秒。 双手待干,穿无菌手术 衣,戴无菌手套。



堂心相对, 手指并拢, 相互揉搓



堂心对手背沿指缝相互揉搓, 交换进行



掌心相对,双手交叉指缝相互揉搓



弯曲手指使关节在另一手掌心旋 转揉搓,交换进行



右手握左手大拇指旋转揉搓, 交换进行



将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋

三、注意事项

- 1. 不应戴假指甲, 保持指甲和指甲周围组织的清洁。
- 2. 手消毒过程中双手保持位于胸前并高于肘部。
- 3. 接台手术应重新进行外科手消毒。
- 4. 取液量宜能完全覆盖所消毒的皮肤。

- 5. 消毒(步骤一+步骤二)时间不少于1分钟或参照消毒产
- 6. 盛装无菌巾或无菌擦手纸的容器每次使用后清洁、灭菌。

医院感染管理科 2015年12月修订



手卫生操作视频: 外科手消毒视频

五、外科手消毒-注意事项

- 1. 外科手消毒过程中,应保持双手位于胸前并高于肘部,使水由手部流向肘部。
- 2. 手术结束摘除手套后,应用洗手液清洁双手。
- 3. 重复使用的布巾容器,应每次使用后清洗、灭菌。
- 4. 外科手消毒时间以消毒产品建议的时间为准。





六、我院手卫生管理要求

①手卫生管理制度

广西医科大学第一附属医院 手卫生管理制度

根据《医务人员手卫生规范》(WS/T 313-2019),结合我院实际情况,制定工作 人员手卫生管理制度。本制度适用于全院各科室和各级各类工作人员。

- 一、手卫生管理部门及其工作职责
- (一) 医院感染管理科。

负责组织手卫生的培训宣教,手卫生执行情况的督导考核、分析、反馈和持续改进。

(二) 医务部。

负责医师和医技人员手卫生执行情况的督导,并将其纳入工作人员绩效考核中。

(三) 护理部。

负责护理人员手卫生执行情况的督导,并将其纳入工作人员绩效考核中。

(四) 后勤办公室和基建科。

在医院建筑新建、改建时,设置符合规范要求的手卫生设施;保障手卫生设施正常 使用,提供合格的手卫生用品。后勤办公室还应负责保洁和物业工人手卫生的管理工作。

②"八桂感控APP"督查



③院级质控

- ✓ 手卫生设施
- ✓ 手卫生依从性
- ✓ 手消毒液消耗量
- ✓ 外科手消毒正确性
- ✓ 科级手卫生依从性 自查

小结

- > 手卫生定义和内容
- > 洗手/卫生手消毒的指征
- > 手卫生的操作要领
- > 管理要求





本系列培训课程还包括手卫生相关视频

- ✓洗手
- ✓外科手消毒等